

AVC: score ABCD2

Paramètres cliniques			Points
A Age	Age	≥ 60 ans < 60 ans	1 0
B Blood pressure	Pression artérielle	PAS > 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg* Autre	1 0
C Clinical features	Caractéristiques cliniques	Déficit moteur unilatéral Troubles de la parole** sans déficit moteur Autre	2 1 0
D Duration of symptoms	Durée des symptômes	≥ 60 minutes 10-59 minutes < 10 minutes	2 1 0
D Diabetes	Diabète	Présent*** Absent	1 0
Total maximum			7

* ou traitement antihypertenseur en cours ; ** dysarthrie ou aphasie ; *** traitement antidiabétique en cours.

Ce score prédit le risque d'AVC dans les 48 heures qui suivent un AIT.

Le risque d'AVC à 48 heures est de :

- 0 % pour un score 0 ou 1
- de 1,3 % pour un score 2 ou 3
- de 4,1 % pour un score 4 ou 5
- et de 8,1 % pour un score 6 ou 7

Il permet de classer les patients en groupes

- à risque faible (scores 0 à 3)
- intermédiaire (scores 4 et 5)
- élevé (scores 6 et 7).

Ces trois groupes présentent un risque d'AVC à 3 mois qui est respectivement de 3,1 %, 9,8 % et 17,8 %.

L'AHA préconise d'hospitaliser tout AIT vu dans les 72 heures s'il présente un score ABCD2 ≥ 3, les autres patients devant bénéficier du bilan étiologique de l'AIT dans la semaine.